

幂零行列

A を $n \times n$ 行列とする。ある自然数 m に対して $A^m = O$ となるとき A は幂零行列 (nilpotent matrix) であると言う。

ここでは、次を示そう。

命題

$n \geq 2$ とする。 $n \times n$ 行列 A が $A = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ \vdots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ の形ならば $A^n = O$ である。

$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & a_{n-1\ n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$ とおく。 $1 \leq k \leq n$ のとき、 $k \leq \ell \leq n$ なる ℓ に対してつねに

$A^\ell \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}^{(k)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \cdots \quad 1$ となることを k に関する数学的帰納法で示す。

$k = 1$ のときは $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ である。よってこの両辺に $A^{\ell-1}$ を掛けると $A^\ell \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ とな

り正しい。

$k \leq m$ のとき正しいと仮定して $k = m + 1$ のときに考える。

$$A^{m+1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}^{(m+1)} = A^m A \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}^{(m+1)} = A^m \begin{pmatrix} a_{1\ m+1} \\ a_{2\ m+1} \\ \vdots \\ a_{m\ m+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = a_{1\ m+1} A^m \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + a_{2\ m+1} A^m \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_{m\ m+1} A^m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}^{(m)}$$

となる。ここで、帰納法の仮定によれば

$$A^m \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A^m \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A^m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{(m)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。よって $A^{m+1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{(m+1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ となる。この両辺に $A^{\ell-(m+1)}$ を掛けると

$$A^\ell \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{(m+1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ となるので帰納法により } 1 \text{ は示された。そうすると, } 1 \text{ より}$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A^n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

となるので $A^n \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ であるから $A^n = O$ となる。■